

Kobiety z ostrą niewydolnością serca szybciej otrzymują pomoc kardiologa niż mężczyźni

J. Płonka⁽¹⁾, N. Węzyk-Wylegała⁽¹⁾, K. Dąbrowska⁽²⁾, L. Rzepiela⁽¹⁾, R. Zieliński⁽¹⁾,
K. Nalewajko⁽¹⁾, P. Feusette⁽¹⁾, M. Gierlotka⁽¹⁾

(1) Klinika I Oddział Kardiologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Instytut Nauk Medycznych, Uniwersytet Opolski, Polska
(2) Studenckie Koło Naukowe "Cardios" przy Klinice Kardiologii, Instytut Nauk Medycznych, Uniwersytet Opolski, Polska


WSTĘP: Ostra niewydolność serca (ONS) to stan zagrożenia życia, wymagający szybkiej diagnostyki i natychmiastowego leczenia. Celem pracy była analiza okresu przedszpitalnego chorych z ONS w zależności od płci.

MATERIAŁY I METODY: W okresie od 06.2019 do 01.2021 przyjęto do SOR w trybie pilnym 768 chorych z rozpoznaniem niewydolności serca (NS), z czego u 122 rozpoznano ONS wymagającą leczenia w Oddziale Intensywnej Terapii Kardiologicznej. Określono czas wystąpienia objawów dekomensacji NS (OBJAWY), pierwszy kontaktu medycznego (PKM) oraz czas konsultacji kardiologicznej na SOR (KK).


WYNIKI: W badanej grupie 768 chorych z NS zgłaszających się na SOR kobiety stanowiły 37%. Rzadziej trafiały one na Oddział Kardiologii z rozpoznaniem ONS niż mężczyźni (29,5% vs 40,2%), tym niemniej częściej umierały w SOR (6,0% vs 2,7%) - tabela. Wśród 122 chorych z ONS leczonych w OITK przeważali mężczyźni (72%), średni wiek wynosił 68 lat a mediana LVEF = 30% [IQR 20-38%]. U obu płci dominował fenotyp ostrej zdekomensowanej niewydolności serca (68% u kobiet i 82% u mężczyzn), aczkolwiek u kobiet nieco częściej występował obrzęk płuc (26% vs 15% u mężczyzn) - tabela. Kobiety szybciej niż mężczyźni zgłaszały się do lekarza lub wzywały karetę pogotowia (mediana czasu OBJAWY->PKM krótsza o 1,6 dnia, tabela), a także krótszy był czas od PKM do konsultacji kardiologa (mediana czasu PKM-KK krótsza o 0,17 dnia). W konsekwencji czas opóźnienia od początku objawów do kardiologa był u kobiet krótszy niż u mężczyzn: 3,1 (0,3-8,4) dnia vs 6,9 (1,3-15,3), p=0,05.

WNIOSKI: Kobiety z ostrą niewydolnością serca przyjmowane do leczenia na Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej szybciej zgłaszają się z objawami do lekarza i szybciej otrzymują pomoc kardiologa.

Przyjęcie chorych z powodu ONS w SOR



Profile pacjentów z ONS przyjętych do Oddziału Ka



Czas opóźnienia

Objawy - Pierwszy Kontakt Medyczny - Konsultacja Kardiologiczna

